



## Proč zde někteří ptáci zůstávají?

Toho, že někteří ptáci odlétají a někteří zůstávají, si lidé všimli již dávno. V roce 1828 holandský vědec Schlegel ustanovil biologické třídění ptactva na ptáky POTULNÉ, STÁLÉ A STĚHOVAVÉ. Na první dvě jmenované třídy se podíváme podrobněji.

STÁLÍ ptáci nikam neodlétají. Většinou jsou vázáni na člověka, zůstávají v jeho nejbližším okolí. Patří mezi ně vrabec, hrdlička, straka, sýkorka nebo koroptev. Po vyhnízdění se nová mláďata stěhují maximálně o několik kilometrů od svého rodného hnízda, aby získali své vlastní teritorium. Jejich rodné teritorium zůstává jejich rodičům.

Za POTULNÉ lze považovat například stehlíka nebo strnada. Létají stovky kilometrů za potravou, ale bez nějakého systému. Snad jedině lze vypožorovat potulování za příznivějším klimatem, ale nejedná se o tah. Není možné říct, že jeden druh je pouze takový či takový. Ptáci jednoho druhu mohou na některých místech žít stálým způsobem života a na jiném potulným způsobem.

<https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=772>