




MLOK SKVRNITÝ *Salamandra salamandra* (L.)

dosahuje délky 150-200 mm. Má nápadně černožluté zbarvení těla, širokou hlavu a za očima nápadné seskupení jedových žláz (parotidy). Žije v lesích od Pyrenejí po Sýrii. V horách vystupuje až do 1000 m. n. m. Nejčastěji ho zastihneme po dešti v lesích, obvykle v blízkosti studánek a potůčků. Přes den se skrývá pod kameny a dřevem, v noci vylézá z úkrytu za potravou. Živí se červy, slimáky a hmyzem. Přezimuje v dírách v zemi nebo dutinách pod skálami, často více exemplářů pohromadě. Samička klade do studánek nebo mokrých příkopů už poměrně vyvinuté larvy ve vaječném obalu, ze kterého se po chvíli uvolňují. ENCYKLOPEDIE



KUŇKA OBECNÁ *Bombina bombina* (L.)

dosahuje délky do 60 mm. Má spláclé tělo a krátké nohy, na břiše nápadné (až výstražné) pomerančově zbarvené až červené skvrny. Samci mají na hrdle rezonanční měchýřky a u prvního prstu přední končetiny zrohovatělé pářící mozoly. Rozšířena je severně od Dunaje po Dánsko a východně po Ural a Kavkaz, zejména v nížinách a kotlinách do 600 m. n. m., a to ve stojatých většinou periodických kalužích. Samičky kladou vajíčka v malých chumáčcích na rostliny. V letním období se od vody vzdaluje jen málo. Zimuje pod vodou a částečně i v půdě. Kožní sekret je jedovatý, brání se jím proti přirozeným nepřítelům. ENCYKLOPEDIE



V ohrožení si lehají na záda, prohnou se, a ukazují výstražné pestré zbarvení spodní strany těla. Někdy si při tom předními končetinami zakrývají oči. UČEBNICE

ROPUCHA OBECNÁ *Bufo bufo* (L.)

má zavalité tělo s bradavičnatou kůží. Za očima má seskupené jedové žlázy (parotidy). Podkloubní hrbolky na spodní straně prstů jsou většinou párové. Samičky dorůstají do velikosti 120 mm, samci jen do 80 mm. Na prvních třech prstech předních končetin mají samci zrohovatělé mozoly. Rozšířena je od západní Evropy až po Japonsko, jižně po severozápadní Afriku. Všude je hojná, ojediněle se vyskytuje až do 2000 m.n.m. Žije v lesích, na polích a v zahradách. Aktivní je v noci, v době páření i přes den. Rozmnožování trvá poměrně krátce. Vajíčka klade v podobě dvouřadých šňůrek mezi vodní rostliny. Je velmi užitečná, ničí velké množství hmyzu a slimáků. ENCYKLOPEDIE



Obr.č.1. Autor: Martin Filip + Tereza Procházková – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6368795>

Obr.č.2. CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109940>

Obr.č.3. Autor: Chmee2 – Vlastní dílo, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11456117>

Zdroj textu:

ENCYKLOPEDIE: Velká kniha živočichů, kolektiv autorů, str. 224, 226 vydavatel'stvo Příroda, ISBN 80-07-00863-2

UČEBNICE: Texty z učebnice: Hravý přírodopis 7, str. 22, Taktik International, ISBN: 978-80-7563-113-8

Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. st. základních škol /na víceletá gymnázia v ČR“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání